

Prävalenzen des Medikamentengebrauchs bei Erwachsenen

	Erwachsene		
Alter	18–59 Jahre	60–79 Jahre	18–64 Jahre
Datenquelle	IFT: ESA	RKI: DEGS1	IFT: ESA
Jahr	2015	2008–2011	2015
	mind. wöchentliche Einnahme	Gebrauch in den letzten 7 Tagen	Gebrauch in den letzten 30 Tagen
psychoaktive Arzneimittel ¹⁾		21,4 %	
Schmerzmittel	17,9 %		47,1 %
opioidehaltige Schmerzmittel		4,1 %	
Antidepressiva	4,1 %	7,9 %	4,9 %
Schlaf-/Beruhigungsmittel	2,7 %	3,3 %	5,2 %
Benzodiazepine		2,5 %	
Antidementiva		4,2 %	
Neuroleptika	1,1 %		1,3 %
Antiepileptika		2,3 %	
Anregungsmittel	0,4 %		0,7 %
Appetitzügler	0,2 %		0,3 %
Anabolika			0,1 %
Klinisch relevanter Konsum	4,5 %		5,2 %
weiblich	5,5 %		6,0 %
männlich	3,6 %		4,5 %
Psychopharmakagebrauch kombiniert mit täglichem Alkoholkonsum		2,8 %	

1) Psychoaktive Arzneimittel: opioidehaltige Schmerzmittel, Aspirin kombiniert mit Koffein, Antiepileptika, Antiparkinsonmittel, Psycholeptika (N05) mit Hypnotika und Sedativa, Benzodiazepinen und Benzodiazepin-verbundenen Mitteln/Z-Substanzen, alle Psychoanaleptika mit Antidepressiva und Antidementiva, alle anderen das Nervensystem beeinflussenden Arzneimittel, opioidehaltige Hustenmittel